

Hoja informativa

# Domark Evo



## Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa / *La evolución de los fungicidas*

**Composición:** Tetraconazol 12,5% p/v (125 g/l)

**Formulación:** Microemulsión

**Envases:** 250 cc · 1 litro

Nº Registro: 23.529



## CARACTERÍSTICAS

Fungicida sistémico específico contra oidio, oidiopsis, moteado, cercospora y septoria de acción preventiva y curativa.

## CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Tratamientos preventivos secuenciados con un intervalo que variará en función del hongo a combatir y la sensibilidad varietal del cultivo a defender.

La lucha curativa (a la aparición de los primeros síntomas, o con síntomas declarados) se afrontará, como norma general, con las dosis más altas y adoptando los plazos más cortos entre tratamientos

## ÉPOCA DE EMPLEO

**Vid:** tratar a partir de que los brotes tengan 5-15 cm y seguir las aplicaciones con 15 días de intervalo entre sí. Dirigir la aplicación a los racimos, realizar una cobertura completa y uniforme (es aconsejable no emplear más de 400 l/ha de caldo). Deben realizarse, al menos, los tratamientos de racimos separados y el envero.

**Manzano:** oídio. Iniciar los tratamientos en prefloración y continuar los mismos cada 12-15 días protegiendo fundamentalmente los órganos que se vayan formando. Manzano y **peral** (moteado): de acuerdo a la tabla de Mills

o, en su defecto, seguir las indicaciones de los boletines de avisos.

**Melocotonero, nectarino y albaricoquero:** en plena floración o a la caída de pétalos.

**Cebada, trigo, centeno y triticale:** efectuar un sólo tratamiento entre el final del encañado y el final de espigado.

| APLICACIONES<br>AUTORIZADAS | PLAZOS DE<br>SEGURIDAD (DÍAS) | MALAS<br>HIERBAS | DOSIS        |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| Albaricoquero               | 14                            | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Alcachofa                   | 7                             | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Alcachofa                   | 7                             | Oidiopsis        | 20-40 cc/hl  |
| Cebada                      | 7                             | Oidio            | 0,6-0,9 l/ha |
| Cebada                      | 7                             | Septoria         | 0,6-0,9 l/ha |
| Centeno                     | 7                             | Oidio            | 0,6-0,9 l/ha |
| Centeno                     | 7                             | Septoria         | 0,6-0,9 l/ha |
| Cucurbitáceas               | 7                             | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Fresales                    | 1                             | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Manzano                     | 14                            | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Manzano                     | 14                            | Moteado          | 35-40 cc/hl  |
| Melocotonero                | 14                            | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Nectarino                   | 14                            | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Ornamentales herbáceas      | n.p.                          | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Ornamentales leñosas        | n.p.                          | Oidio            | 20-40 cc/hl  |
| Peral                       | 14                            | Moteado          | 35-40 cc/hl  |
| Remolacha azucarera         | 14                            | Oidio            | 0,4-0,8 l/ha |
| Remolacha azucarera         | 14                            | Cercospora       | 0,4-0,8 l/ha |
| Tomate                      | 3                             | Oidiopsis        | 25-40 cc/hl  |
| Trigo                       | 7                             | Septoria         | 0,6-0,9 l/ha |
| Trigo                       | 7                             | Oidio            | 0,6-0,9 l/ha |
| Triticale                   | 7                             | Oidio            | 0,6-0,9 l/ha |
| Triticale                   | 7                             | Septoria         | 0,6-0,9 l/ha |
| Vid                         | 14                            | Oidio            | 20-30 cc/hl  |

Albaricoquero: realizar un máximo de 4 aplicaciones por período vegetativo.

Fresales: realizar un máximo de 3 aplicaciones por período vegetativo y 1,2 l/ha de producto formulado.

## MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

**Mamíferos (A) · Aves (A) · Peces (A) · Abejas (Compatible)**

## DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

**Dossier Fungicidas Viña (Otros)**  
**MSDS Domark Evo (Hoja de seguridad)**