

•Camtus

Información Técnica



Numero de registro:	23.750
Composición:	50% de boscalid carboxamidas
Familia química:	carboxamidas
Formulación:	gránulos dispersables (WG)
Envase:	1 kg
Usos autorizados y dosis:	Vid, Botritis: 0,1 - 0,12% (max. 1,2 kg/ha) Vid, Oídio: 0,02 % Judía verde, Botritis y Sclerotinia: 0,1 %
Plazo de seguridad:	28 días en vid. 7 días en judía.
LMR:	Uva: 2 mg/kg vino: 1 mg/l

- > Anti-botrytis
- > Control de oídio
- > Control de lacasa

**El camino
hacia la calidad.**



BASF Española S. L.
Can Rabia, 3-5
08017 Barcelona
Tel. Dpto. Técnico: 95 428 16 60
mail: agro_basf@basf.com
www.agro.basf.es

 **BASF**
The Chemical Company

•Camtus®
El fungicida que asegura
la máxima calidad del vino.

 **BASF**
The Chemical Company


Cantus® : Eficacia total en la producción de un vino de calidad.

- > **Cantus®** garantiza un nivel de protección contra Botrytis equivalente a las mejores referencias del mercado.
- > **Cantus®** presenta una protección segura contra oídio.
- > Gracias a su original método de acción contra Botrytis, no existe ninguna resistencia cruzada entre **Cantus®** y los otros fungicidas anti-botrytis.
- > **Cantus®** es flexible tanto para incluir en los distintos programas de tratamientos como en el periodo de aplicación.
- > Utilizado entre final de floración y cierre del racimo, **Cantus®** refuerza la acción contra oídio, enfermedad que actúa como "puerta de entrada" para otros hongos secundarios.
- > **Cantus®** aporta una acción paliativa sobre los efectos negativos producidos por el encima lacasa.
- > **Cantus®** no tiene efectos negativos sobre la maduración de la uva, la fermentación o las cualidades organolépticas del vino.



Cantus® (Boscalid) es un producto que pertenece a una nueva familia química (carboxamidas) con diferente modo de acción.

- > **Inhibe la germinación de las esporas.**
- > **Inhibe el crecimiento del tubo germinativo.**



Recomendaciones de empleo

- > **Cantus®** se integra perfectamente en todos los programas de lucha contra la Botrytis.
- > **Cantus®** se utiliza de la floración al envero. Plazo de empleo: 28 días antes de la cosecha.
- > Se recomienda aplicar **Cantus®** una única vez por temporada, para el control de botritis y un máximo de 3 tratamientos para el control de oídio.
- > Gracias a su efecto contra oídio y su acción anti-lacasa, **Cantus®** maximiza sus beneficios en las aplicaciones tempranas (entre final de floración y cierre de racimo).



A

Final floración.
Caida de los capuchones florales.



B


Cierre del racimo.



C
Envero.

Cantus® en fin de floración.

Eficacia sobre Botrytis cinerea en la recolección (%)



19 pruebas realizadas en Francia de 2002 a 2004.

Programa de 3 tratamientos

