BASF
The Chemical Company

Storm®

Cebo en bloque de cera (BB)

Rodenticida

Composición:
0,005% p/p de Flocoumafen
0,001% p/p de Sustancia de sabor amargo
100% excipientes csp

Inscrito en el Registro de Plaguicidas Zoosanitarios de Uso Ganadero con el Nº 01907-P
Uso reservado y exclusivo a personal especializado

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta.

Contenido neto: 10 kg

Peso medio aprox. del bloque: 16 gramos

P.V.P.

Registrado por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Fabricante:
BASF Agro B.V., Arnhem
Wädenswil Branch
Moosacherstrasse 2
CH-8820 Wädenswil/Au
Switzerland

(01)04014348629867

® = Marca registrada de BASF

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Storm® es un rodenticida anticoagulante eficaz contra gran variedad de especies de roedores. **Storm®** interfiere los mecanismos de coagulación de la sangre produciendo hemorragias generalizadas. **Storm®** PRODUCE LA MUERTE DE RATAS Y RATONES DESPUÉS DE UNA SOLA ALIMENTACIÓN, aunque la muerte ocurre al cabo de unos días. **Storm®** está listo para ser usado y no se ha de diluir, ni mezclar.

APLICACIONES AUTORIZADAS
- Uso ambiental y en la industria alimentaria para el control de roedores en locales y edificios
- Exteriores de recintos y almacene contra ratas (*Rattus* sp) y ratones (*Mus* sp).

MODO DE EMPLEO
En almacenes y recintos contra ratas y ratones:
- Antes de colocar el cebo, determinar la localización de todas las entradas y madrigueras y zonas de alimentación. Los cebos deben de ir en porta-cebos correctamente etiquetados. Eliminar inmediatamente cualquier cebo encontrado fuera de los puntos de cebado.
- Ratas: los puntos de cebo pueden estar tan cerca como a distancias de 5 metros en infestaciones fuertes. Colocar tres bloques de **Storm®** en cada punto de cebo y uno en cada madriguera. Examinar los puntos de cebo al cabo de 3 días y reponer donde hayan sido comidos, repetir la inspección a intervalos de 7 días, hasta terminar con la plaga. Normalmente sólo se requieren 3 ó 4 inspecciones para exterminar a los roedores.
- Ratones: localizar bloques simples de **Storm®** hasta con 2 metros de separación en zonas donde la actividad es clara, particularmente donde se vean excrementos. Colocar los bloques en posiciones inaccesibles a los niños y a los animales domésticos. Inspeccionar los puntos de cebo y reemplazar los bloques en la misma forma que para las ratas.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede producir:
Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina -tiempo prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión **NO** provoque el vomito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos:
- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25 g)..
- Antídoto: Vitamina K1 (Konakion).
- Controle el tiempo de protrombina o INR.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20

OTRAS PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los alimentos y sus envases, así como las superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

ALMACENAR EL PRODUCTO EN SUS ENVASES ORIGINALES CERRADOS EN UN LUGAR SEGURO.

Nocivo

Nocivo: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.
Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuáticos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Úsense guantes adecuados.
Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instruciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (Si es posible muéstrele la etiqueta)

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de lote y fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase.

Bajo condiciones normales y controladas de almacenamiento este producto tiene una vida media de 5 años desde la fecha de producción.

81056174ES1031

Uso Informativo